


ЕРВОЙ®  
(ипилимумаб)

---

Памятка  
пациента



IORU16NP05219 АБГҮҮТ 2016

# Препарат ЕРВОЙ® (ипилимумаб)

В данной памятке содержится важная информация.

Вам следует всегда носить ее с собой.

Немедленно свяжитесь с лечащим врачом, если у Вас возник какой-либо из этих побочных эффектов

## СО СТОРОНЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА<sup>1</sup>

- диарея (водянистый, жидкий или размягченный стул), рвота или тошнота
- учащение стула по сравнению с обычным
- кровь в стуле, потемнение стула
- боль или болезненность при надавливании в области желудка, повышение температуры тела

## СО СТОРОНЫ ПЕЧЕНИ<sup>1</sup>

- пожелтение глаз или кожи (желтуха)
- боль в верхней части живота справа
- утомляемость
- потемнение мочи

## СО СТОРОНЫ КОЖИ<sup>1</sup>

- кожная сыпь с зудом или без
- волдыри и/или отслаивание кожи, язвы в полости рта
- сухость кожи

## СО СТОРОНЫ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ<sup>1</sup>

- мышечная слабость
- онемение или покалывание в кистях и стопах
- головокружение, потеря сознания или затрудненное пробуждение

## СО СТОРОНЫ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ<sup>1</sup>

- головные боли
- нечеткость зрения или двоение в глазах
- утомляемость
- снижение полового влечения
- изменения поведения (например, раздражительность или забывчивость)

## СО СТОРОНЫ ОРГАНА ЗРЕНИЯ<sup>1</sup>

- покраснение глаз
- боль в глазах
- нарушения зрения или нечеткость зрения

## ЭТО ВАЖНО!

- Немедленно сообщите лечащему врачу о любом из этих симптомов
- Симптомы, кажущиеся незначительными, могут быстро ухудшиться при отсутствии лечения<sup>1</sup>
- Симптомы могут быть отсроченными и возникать через недели или месяцы после введения последней дозы<sup>1</sup>
- Не пытайтесь лечить эти симптомы самостоятельно, не проконсультировавшись в первую очередь с лечащим врачом.
- Всегда носите Памятку для пациента с собой и показывайте ее любому врачу, к которому обращаетесь за консультацией. Обязательно говорите им, что получаете лечение ипилимумабом.

Для получения более подробной информации обратитесь к Инструкции по применению лекарственного препарата для медицинского применения ЕРВОЙ®.

## Контактная информация моего лечащего врача

ФИО врача

---

---

---

Рабочий телефон

---

---

---

Телефон для круглосуточной связи

---

---

---

ФИО пациента и телефон

---

---

---

ФИО лица, осуществляющего уход (в экстренном случае)

---

---

---

## ВАЖНАЯ информация для специалистов здравоохранения

Этот пациент получает препарат ЕРВОЙ®, с применением которого могут быть связаны воспалительные нежелательные реакции.

Иммуноопосредованные нежелательные реакции (иоНР) в большинстве случаев возникают во время курса лечения, однако также могут появиться и через месяцы после введения последней дозы препарата ЕРВОЙ®.

Ранняя диагностика и соответствующее лечение необходимы, чтобы минимизировать жизнеугрожающие осложнения. Существуют специальные рекомендации по лечению иоНР, связанных с применением препарата ЕРВОЙ®<sup>1</sup>

Обратитесь к Руководству по лечению иммуноопосредованных нежелательных реакций и к брошюре “Важная информация для специалистов здравоохранения по минимизации рисков“, которые Вы можете найти по ссылке <http://goo.gl/GvXLgr> или используя QR код



1. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения ЕРВОЙ®.